

Инструкция

по применению сыворотки против пастереллеза крупного рогатого скота, овец и свиней

1 Общие сведения

- 1.1 Сыворотка против пастереллеза крупного рогатого скота, овец и свиней.
- 1.2 Представляет собой сыворотку крови животных-продуцентов, полученную после гипериммунизации инактивированным антигеном *Pasteurella multocida*.
- 1.3 По внешнему виду сыворотка – опалесцирующая жидкость от светло-розового до красного цвета. В процессе хранения допускается образование жироподобной пленки и незначительного осадка серо-белого цвета, разбивающегося при встряхивании.
- 1.4 Сыворотку упаковывают в стерильные стеклянные флаконы по 50, 100 и 200 см³, плотно закрывают резиновыми пробками и обкатывают металлическими колпачками.
- 1.5 Срок годности сыворотки 4 года с даты изготовления при условии хранения в сухом темном месте при температуре от плюс 2 до плюс 15 °С.

2 Биологические свойства

- 2.1 Сыворотка в своем составе содержит специфические антитела против возбудителя пастереллеза.
- 2.2 Сыворотка безвредная и ареактогенная, обладает лечебными и профилактическими свойствами.
- 2.3 Пассивный иммунитет после введения сыворотки у животных сохраняется 7 дней.

3 Порядок применения

- 3.1 Сыворотку против пастереллеза сельскохозяйственных животных применяют с лечебной и профилактической целью в неблагополучных по пастереллезу животноводческих хозяйствах.
- 3.2 Препарат вводят с соблюдением установленных правил асептики и антисептики. Перед введением сыворотки инструменты стерилизуют кипячением и для каждого животного используют отдельную иглу, кожу на месте введения выстригают и обрабатывают дезинфицирующим средством, разрешенным к применению. За животными, которым вводили сыворотку, обеспечивают наблюдение.
- 3.3 Перед применением и в процессе применения флаконы с сывороткой встряхивают. В зимнее время сыворотку подогревают в водяной бане до температуры (36-37) °С.
- 3.4 Сыворотку используют в день вскрытия флакона. Неиспользованная сыворотка специального обезвреживания не требует, не представляет опасности для животных, человека и окружающей среды.
- 3.5 Сыворотку вводят подкожно в следующих дозах:

- телята, ягнята, поросята	10-30 см ³
- крупный рогатый скот, овцы, свиньи	30-40 см ³

Примечание: применение сыворотки с лечебной целью может дать некоторый эффект только в самом начале заболевания, при появлении первых симптомов.

При этом сыворотку вводят внутримышечно или внутривенно в двойной дозе.

3.6 При применении сыворотки поросятам и свиньям следует начать с инъекции небольшой группе (1-3 гол) животных, контролируя их общее состояние. В случае проявления признаков анафилаксии, аллергии следует применить симптоматическое противоаллергическое лечение, а рекомендуемую дозу сыворотки для применения развести 5 % раствором глюкозы в соотношении 1:4.

3.7 О введении сыворотки животным составляют акт в соответствии с требованиями Ветеринарного законодательства Республики Беларусь.

3.8 Наряду с применением сыворотки, особое внимание должно быть уделено проведению ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий, направленных на ликвидацию инфекции и повышение устойчивости организма животных к заболеванию.

3.9 Убой животных на мясо и использование молока для пищевых целей после применения сыворотки разрешается не ранее чем через 3 сут.

4 Меры личной профилактики

4.1 При работе с сывороткой следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными лекарственными средствами.

5 Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае массовых осложнений применение сыворотки данной серии прекращают, об этом немедленно сообщают изготовителю, а также в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр». Одновременно изготовителю и в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» для контроля направляют по два неиспользованных флакона препарата из серии, вызвавшей осложнения, с сопроводительным письмом (актом), подписанным ветеринарным врачом, где указывают дату введения, количество привитых и заболевших животных, характер осложнения и режим хранения сыворотки.

Инструкция по применению Сыворотки против пастереллеза крупного рогатого скота, овец и свиней разработана специалистами УП «Витебская биофабрика».

Изготовитель: УП «Витебская биофабрика»
211309, п. Должа, Витебского района.